

# به نام خدا

موضوع: هرني اينگوئينال


# هرنی



هرنی

- فتق مَغْبِنِی یا هرنی اینگوینال  
به فتق در ناحیه کانال مغبنی  
(بالای کشاله ران) اطلاق  
میشود.

# جراحی ترمیم فتق مغبنی راست



# هرنی

- فتق مغبنی یا اینگوینال به معنی بیرون زدگی احشای شکمی به ویژه روده باریک به دورن کانال اینگوینال است و این بیماری بیش از ۹۵ درصد در مردان اتفاق می افتد.
- این نوع فتق شایعترین فتق در مردان است

## علت هرنی

- علت اصلی ایجاد فتق‌های شکمی ضعف یا نقص در جدار دیواره شکمی یا افزایش فشار بر آن در یک ناحیه است. فتق مغبنی فتق شکمی است که در ناحیه کشاله ران اتفاق می‌افتد.

# علت هرنی


- از عوامل شایع :
- عوامل اکتسابی
- سن بالا
- وجود فتق رانی بر روی بروز فتق مغبنی
- وجود بیماری‌هایی مثل: آسم، بیماری‌های ضعیف کننده
- آوردن فشار به بدن به گونه‌ای که فرد جسم سنگینی را بلند کند

# علت هرنی

- در بچه‌ها، نارس بدنیا آمدن کودک، جنس مذکر، ...
- همچنین عللی ارثی یا فامیلی و کسانیکه در بدو تولد دچار دررفتگی مادرزادی سر استخوان ران بوده‌اند، از علل مساعدکننده است



# هرنی



انواع هرنی

- فتق اینگوئینال میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

## انواع هرنی

- در صورت وجود هم زمان فتق مستقیم و غیر مستقیم در یک طرف به آن

هرنی


Pantaloo

می‌گویند

# انواع هرنی

- فتق غیر مستقیم: این نوع فتق به دلیل شل شدن دیواره تحتانی شکم ایجاد می‌شود که باعث حرکت روده از طریق حلقه عمقی اینگوینال به درون کانال اینگوینال می‌شود.
- فتق مستقیم: در این نوع فتق به علت اختلال مادرزادی، روده باریک بدون گذر از حلقه عمقی اینگوینال بلکه از طریق جداره خلفی کانال وارد این کانال می‌شود.

# هرنی کودکان



Umbilical  
hernia

# علائم فتق مغبنی :

برآمدگی در کنار کشاله ران یا کیسه بیضه

ناراحتی در کشاله ران و درد

تهوع و درد ناگهانی به علت به دام انداخته شدن روده باریک در کانال

احساس سنگینی، تورم، سرخوردن و احساس سوزش در ناحیه فتق،  
کیسه بیضه و یا بخش داخلی ران

# درمان هرنی

درمان اساسی جراحی و ترمیم فاسیا و جدار شکم است  
جراحی به روش لایاروسکوپیک اغلب روش ترجیحی ترمیم  
فتق (هرنیورافی) است.

در موارد عدم جراحی اقدامات نگهدارنده مانند استفاده از فتق  
بند و اجتناب از افزایش فشار داخل شکم (مانند سرفه و  
زورزدن) پیشنهاد میشود

## درمان هرنی

- اگر فتق دو طرفه باشد، ترجیح روش جراحی لاپاروسکوپیک به جراحی باز بیشتر خواهد بود، چرا که هر دو طرف را می توان هم زمان جراحی کرد بدون اینکه نیاز به بازکردن بیشتر بدن وجود داشته باشد.



# هرنی قبل و بعد

Before



After



# مراقبت

- مراقبت های پس از جراحی لاپاروسکوپیک
- حمام: دوش گرفتن و حمام 24 تا 48 ساعت پس از جراحی توصیه می شود.
- فعالیت: هر چه زودتر فعالیت های عادی خود را از سر بگیرید.

## مراقبت

- بازگشت به سرکار: کسانی که به جای جراحی باز، جراحی لاپاروسکوپی را انتخاب کرده باشند، عموماً زودتر قادرند به سرکار برگردند.

# فیلم



پایان

• با تشکر از توجه شما

زهرا پورعبدی